

2068R Комплекс сильных ферментов, банка, 60 табл.

2068T Комплекс сильных ферментов, банка, 30 табл.

Предназначение	Рекомендации по применению
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника протеолитических ферментов, бифидобактерий	Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1-1,5 месяца. При необходимости прием можно повторить 2-3 раза в год.
При острых и хронических воспалительных процессах, в первую очередь при инфекциях дыхательных и мочевыводящих путей	Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1-1,5 месяца. При необходимости прием можно повторить 2-3 раза в год.
Для улучшения процесса пищеварения и усвоения питательных веществ	Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1-1,5 месяца. При необходимости прием можно повторить.
Для нормализации состояния микробиоты (микрофлоры) кишечника	Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1-1,5 месяца. При необходимости прием можно повторить 2-3 раза в год.
В комплексных anti-age и beauty программах	Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – не менее 1 месяца. При необходимости прием можно повторить.
Для поддержания работы печени и поджелудочной железы	Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – не менее 1 месяца. При необходимости прием можно повторить 2-3 раза в год.

<p>При длительном употреблении антибактериальных, противовирусных, и других лекарственных препаратов, которые обладают способностью подавлять активность ферментов и нарушать метаболические процессы</p>	<p>Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – не менее 1 месяца. При необходимости прием увеличить на срок применения антибактериальных, противовирусных, и других лекарственных препаратов, которые обладают способностью подавлять активность ферментов и нарушать метаболические процессы.</p>
<p>При злоупотреблении алкоголем, курении</p>	<p>Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – не менее 1 месяца. При необходимости прием можно повторить 2-3 раза в год.</p>
<p>Для профилактики и поддержки организма при метаболическом синдроме, сахарном диабете 2 типа</p>	<p>Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – не менее 1 месяца. При необходимости прием можно повторить.</p>