

## Нейроэксель, 80 гр.

**Состав:** мука иерусалимского артишока, фосфатидилсерин, альфа-липоевая кислота.

<b>Предназначение</b>	<b>Рекомендации по применению</b>
В качестве биологически активной добавки к пище – источника альфа-липоевой кислоты, полифенольных соединений, витаминов, минеральных веществ	Взрослым по 1 г (¼ ст.л.) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 2 месяца.
Как комплексное средство, улучшающее память, мыслительные способности, концентрацию внимания и замедляющее процессы старения мозга	Взрослым по 1 г (¼ ст.л.) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Для профилактики возрастного снижения когнитивных функций, деменции	Взрослым по 1 г (¼ ст.л.) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1-2 месяца.
В программах профилактики атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний	Взрослым по 1 г (¼ ст.л.) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1-2 месяца.
Для улучшения работы нервной системы после перенесенных заболеваний, вирусных и бактериальных инфекций	Взрослым по 1 г (¼ ст.л.) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1-2 месяца.
В комплексных программах профилактики оксидативного стресса	Взрослым по 1 г (¼ ст.л.) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Для повышения стрессоустойчивости в периоды высоких психоэмоциональных нагрузок	Взрослым по 1 г (¼ ст.л.) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости повторить прием.



## Нейроэксель, 80 гр.

Для улучшения психоэмоционального состояния при неврозах, депрессиях	Взрослым по 1 г ( $\frac{1}{4}$ ст.л.) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости повторить прием.
Чтобы поддержать организм во время тренировок и улучшить спортивные показатели	Взрослым по 1 г ( $\frac{1}{4}$ ст.л.) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости повторить прием.
Для выведения из организма токсинов, улучшения работы пищеварительного тракта	Взрослым по 1 г ( $\frac{1}{4}$ ст.л.) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

